



# ENFERMEIRO

CADERNO DE PROVA  
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (questões) itens, ordenados **de 1 a 40, com alternativas de A a D**; sendo apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.
2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
4. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
5. A correção da prova será feita por processo de leitura óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o candidato deverá atentar para a orientação contida nesta capa da prova sobre a **forma correta de preenchimento do campo relativo a cada questão**. Se o campo for preenchido em desacordo com essa orientação, o candidato arcará com o ônus de não ter computada a exata pontuação alcançada

MARQUE ASSIM 

NÃO MARQUE ASSIM



- 6.
7. A assinatura do(a) candidato(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação e pontuação neste certame.
8. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
10. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, nos últimos 30 minutos de prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.
12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova de acordo com cronograma e após a divulgação do gabarito, que estará disponível no site <https://funatec.org.br>

**BOA PROVA A TODOS!**



1 Parece que a sociedade está chegando a um consenso. Pais, educadores, pediatras, gestores públicos, todos  
2 percebemos que o excesso de telas, especialmente do celular com seus aplicativos, está provocando danos às nossas  
3 crianças e adolescentes.

4 Nossa juventude vive uma crise: perdas no desenvolvimento, dificuldades de aprendizado e atenção, privação de  
5 sono, transtornos comportamentais e isolamento. Reportagem recente da Folha, que analisou dados do SUS de 2013 a  
6 2023, mostrou aumentos que chegam a estrondosos 1.500% em atendimentos por ansiedade e depressão entre 10 e 19  
7 anos, especialmente em meninas.

8 Evidências científicas apontam que, se o uso excessivo das telas não é o único culpado, é um dos principais  
9 implicados.

10 Sabemos que redes sociais e outros aplicativos criam mecanismos para provocar dependência, e as crianças são  
11 mais suscetíveis. Com isso, elas passam cada vez mais tempo na tela, chegando a 9 ou 10 horas por dia — e começam  
12 cada vez mais cedo.

13 A sucessão de conteúdos curtos, publicitários e superficiais as torna consumistas, apáticas, acríticas,  
14 desatentas, incapazes de ler. As bolhas de radicalização geradas pelo algoritmo promovem negacionismo científico e  
15 climático, intolerância, violência e bullying, e as deixam suscetíveis a fanatismo político e golpes cada vez mais  
16 sofisticados.

17 Várias medidas estão em marcha para reduzir o uso de telas pelos jovens. Famílias estão se mobilizando para  
18 retardar a entrega do celular. Um guia sobre o uso adequado de telas está sendo criado por especialistas e equipes de  
19 sete ministérios. A regulamentação das redes está voltando à pauta.

20 Além disso, muitas escolas estão optando pelo banimento do celular, num movimento que ocorre  
21 simultaneamente em inúmeros países, por iniciativa de governos ou de comunidades escolares.

22 A escola é o espaço público primordial da criança, onde ela adquire habilidades fundamentais, como  
23 colaboração, foco, resolução de problemas e conflitos, além de ter contato com artes, esportes e cidadania. Um lugar  
24 para aprender a pensar criticamente, a se relacionar com o outro, com o coletivo, com o mundo.

25 O óbvio: a mera presença do celular na sala de aula, mesmo na mochila, já perturba a atenção. Estudos mostram  
26 um sério prejuízo no aprendizado. Isso não se discute mais.

27 Mas há o precioso recreio. Com as cidades inseguras e crianças confinadas e sem contato com amigos e com a  
28 natureza, o pátio escolar se tornou o último reduto da mais essencial atividade da infância: o brincar. E o celular  
29 transforma brincadeiras e trocas de afeto em um deserto de imobilidade, isolamento e bullying.

30 A escola, como espaço regulamentado, oferece uma valiosa pausa para viver no mundo real, o que é cada vez  
31 mais difícil lá fora. Isso não significa afastar a criança da tecnologia: existem outros meios menos distrativos, mais  
32 eficazes e seguros para esse fim. O uso do celular pode ser permitido para alunos que os necessitem por questões de  
33 saúde e em alguns momentos, para que a escola cumpra uma função que precisa assumir: a educação midiática. Mas  
34 a presença do aparelho no dia a dia não faz sentido.

35 A rede municipal de ensino do Rio de Janeiro foi a primeira a banir celulares, exceto para uso pedagógico  
36 autorizado pelo professor. Mais de 650 mil alunos da rede municipal e outros milhares de estudantes em grandes  
37 escolas privadas já vivem essa realidade. Os primeiros resultados são excelentes: satisfação de professores, de famílias  
38 e até dos alunos, que recuperam o prazer de brincar, interagir e aprender.

39 Está na hora de espalhar essa onda por todo o Brasil.

Daniel Becker e Renan Ferreirinha, Folha de S. Paulo, <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2024/06/banir-celular-nas-escolas-ja-trouxe-bons-resultados.shtml>

**LINGUA PORTUGUESA**

**01.** De acordo com o texto,

- a) O uso exagerado de celulares pode prejudicar a capacidade de concentração e de memorização.
- b) Não se pode afirmar que prejuízos ao sono são alguns dos problemas causados pelo uso excessivo do celular e outras telas digitais na infância.
- c) A expressão, “*Isso não se discute mais*” (L.26), revela que o articulista é a favor de uma medida radical impositiva para a proibição do celular na escola.
- d) Limitar o uso de celulares na escola é a única forma para prevenir a sobrecarga digital e promover o bem-estar dos educandos.

**02.** Com relação o tema discutido no texto, é correto o que se afirma em:

- a) A deterioração da educação se deu depois da entrada do celular na escola.
- b) Embora haja algumas limitações pelo uso do celular, ele possibilita o estreitamento de vínculos entre as pessoas, e, na escola, incentiva a pesquisa e a curiosidade, facilitando o acesso e a democratização da informação.
- c) O enunciado final, último parágrafo do texto, faz referência sobretudo às ideias apresentadas no parágrafo anterior.
- d) Impor limites ao uso do celular na escola pode prejudicar o educando quanto ao acesso à tecnologia, o que afetar o educando negativamente.

**03.** É exemplo de predicado verbo-nominal a oração:

- a) “A sucessão de conteúdos curtos, publicitários e superficiais as torna consumistas” (L.13).
- b) “Várias medidas estão em marcha” (L.17).
- c) “A escola é o espaço público primordial da criança” (L.22).
- d) Mais de 650 mil alunos da rede municipal e outros milhares de estudantes em grandes escolas privadas já vivem essa realidade. (L.36/37).

**04.** Exerce a mesma função de “de radicalização” (L.14) a expressão:

- a) “do celular” (L.20).
- b) “de problemas” (L.23).
- c) “do celular” (L.32).
- d) “de estudantes” (L.36).

**05.** No texto, funciona como agente da ação verbal:

- a) “guia” (L.18).
- b) “atenção” (L.25).
- c) “Isso” (L.31).
- d) “rede” (L.35).

**06.** É exemplo de predicado verbal a oração:

- a) “Um guia sobre o uso adequado de telas está sendo criado por especialistas” (L.18).
- b) “A escola é o espaço público primordial da criança” (L.22).
- c) “o pátio escolar se tornou o último reduto da mais essencial atividade da infância” (L.28).
- d) “Os primeiros resultados são excelentes” (L.37).

**07.** Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que ele denota em

- a) “de” em “privação de sono” (L.4/L.5) – posse.
- b) “se” (L.8) – condição.
- c) “para” (L.10) – direção.
- d) “até” (L.38) – limite.

**08.** A ação verbal que está devidamente explicada é

- a) “mostrou” (L.6) – passado em processamento.
- b) “está sendo” (L.18) – presente momentâneo.
- c) “necessitem” (L.32) – presente incerto.
- d) “cumpra” (L.33) – futuro certo.

**09.** Exercem a mesma função sintática os termos:

- a) “meios” (L.31) e “que” (L.20).
- b) “escola” (L.22) e “onde” (L.22).
- c) “pátio” (L.28) e “os” (L.37).
- d) “recreio” (L.27) e “meios” (L.31).

**10.** Sobre os recursos linguísticos do texto, é correto afirmar:

- a) Os dois pontos da linha 4 foram usados pela mesma razão do travessão da linha 11.
- b) Na palavra “violência” (L.15), o “a” é morfema de gênero, assim como “a” em “valiosa” (L.30).
- c) A palavra “bullying” (L.29) pode ser definida como um neologismo.
- d) A palavra “uso” (L.35) pode ser caracteriza como um exemplo de formação por derivação regressiva.

**11.** É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito em:

- a) “está” (L.1) denota ideia de estado.
- b) Em “todos percebemos” (L.1/L.2), há a ocorrência de um recurso linguísticos denominado silepse de pessoa.
- c) “consumistas” (L.13) é um atributo do sujeito.
- d) “se” (L.26) indetermina o sujeito.

## 12. No texto


- a) “disso” (L.20) é anafórico de “regulamentação” (L.19).
- b) A regência de “necessitem” (L.32), contexto em que o verbo está inserido, apresenta-se em conformidade com os padrões cultos gramaticais.
- c) O adjetivo “grandes”, em “grandes escolas privadas” (L.36/L.37), se transposto para depois do substantivo, o sentido do período em que está inserido, permanece invariável.
- d) A palavra “onda” (L.39) está colocada em sentido denotativo.

## 13. No texto

- a) “estrondosos” (L.6) possuiu o mesmo valor sintático de “apáticas” (L.13).
- b) Possuem o mesmo valor morfológico os termos “que” (L.10) e “que” (L.38)”.
- c) O vocábulo “onde” (L.22) pode ser substituído pela expressão “em que”, mantendo o mesmo valor semântico e gramatical.
- d) A palavras “sério” e “prejuízo” (L.26) são acentuadas por idênticas razões.

## 14. O fragmento em que inexistente qualquer termo usado em sentido conotativo é o que está transcrito em

- a) “todos percebemos que o excesso de telas” (L.1/L.2).
- b) “As bolhas de radicalização geradas pelo algoritmo promovem negacionismo científico e climático” (L.14/15).
- c) “Várias medidas estão em marcha” (L.17).
- d) “Mas há o precioso recreio” (L.27).

**A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À FIGURA ABAIXO:**

## 15. Na imagem acima, está presente a figura de linguagem indicada abaixo:

- a) Paradoxo.
- b) Metonímia.
- c) Metáfora
- d) Antítese

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

## 16. Analise a seguintes proposições lógicas e assinale corretamente a que representa uma bicondicional.

- a) Se todos forem à festa, então ninguém ficará em casa.
- b) Ou você recebe o dinheiro ou eu recebo por você.
- c) Ana ganhará um presente, se e somente se tirar nota dez em matemática.
- d) Ninguém estudou para a prova!

## 17. O desvio padrão de um conjunto de dados é igual a 10, dessa forma, pode-se afirmar que a variância desse mesmo conjunto de dados é igual a:

- a) 100.000
- b) 10.000
- c) 1.000
- d) 100

## 18. Dada duas proposições lógicas p e q, pode-se afirmar que elas são uma disjunção quando se apresentarem da seguinte forma:

- a)  $p \rightarrow q$
- b)  $p \wedge q$
- c)  $p \vee q$
- d)  $p \leftrightarrow q$

## 19. Uma loja de veículos está prestes a vender um carro e obter 20% de lucro sobre o valor de sua venda, tal veículo possui um custo total de R\$ 81.000,00. Sabendo que o valor de venda é composto pela soma do custo total com o lucro desejado, assinale corretamente o valor do lucro que será obtido pela loja caso a venda seja realizada.

- a) R\$ 20.250,00
- b) R\$ 16.200,00
- c) R\$ 18.400,00
- d) R\$ 11.540,00

## 20. Um capital de R\$ 10.100,00 foi aplicado a juros compostos com uma taxa anual de 2%, por um período de 8 anos. Com base nessas informações, assinale corretamente a assertiva que representa aproximadamente o possível rendimento relativo a 20% do capital mencionado, caso esse valor fosse aplicado nas mesmas condições do valor integral.

- a) R\$ 1.733,50
- b) R\$ 1.844,88
- c) R\$ 113,14
- d) R\$ 346,75

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

- 21.** A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A HAS é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Assinale a alternativa que apresenta os níveis pressóricos para o diagnóstico de HAS leve ou estágio I em adultos com mais de 18 anos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva e a posição do paciente recomendada para a aferição da PA, conforme Ministério da Saúde.
- pressão arterial sistólica entre 120-139 mmHg e pressão arterial diastólica entre 80-89 mmHg e posição deitada
  - pressão arterial sistólica entre 140-149 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90-99 mmHg e posição deitada
  - pressão arterial sistólica entre 140-159 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90-99 mmHg e posição sentada
  - pressão arterial sistólica entre 120-139 mmHg e pressão arterial diastólica entre 80-89 mmHg e posição sentada.
- 
- 22.** Foi prescrito para um paciente internado na clínica cirúrgica 650 mg de antimicrobiano, EV, de 6/6h. A unidade dispõe de frascos ampola da medicação de 1g e ampolas de diluente de 10 mL. Após diluir a medicação utilizando os fármacos disponíveis, quantos ml da solução devem ser administrados em cada horário?
- 7,5 mL.
  - 6,5 mL.
  - 5,5 mL.
  - 3,5 mL
- 
- 23.** O Enfermeiro ao preparar o material para a realizar um procedimento infectado identificou que não tinha luvas na unidade de saúde, e, mesmo assim realizou o procedimento. Embora o uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho seja uma orientação do Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e uma responsabilidade do profissional, ao executar o curativo nessas condições, o enfermeiro agiu com
- imperícia.
  - imprudência.
  - negligência.
  - autonomia
- 
- 24.** Mulher, 70 anos, apresenta uma parada cardiorrespiratória (PCR) na chegada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) é iniciada, e, logo após, é analisado o ritmo. O ritmo da PCR constatado elétrica sem pulso (AESP). Qual é a principal droga e a dose a ser administrada a seguir?
- 300 mg de amiodarona
  - 1m de noradrenalina.
  - 0,5 mg de adrenalina
  - 1m de adrenalina
- 
- 25.** O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética desses profissionais. Dentre as afirmativas abaixo indique quais se relacionam aos direitos no âmbito das relações com trabalhadores de enfermagem, saúde e outros:
- Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e Liberdade
  - Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência
  - Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde
  - Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência
- I e II, apenas;
  - I e IV, apenas;
  - I e III, apenas;
  - II e IV, apenas;
- 
- 26.** Na rotina dos serviços de saúde, todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto contra o sarampo devem iniciar ou completar o esquema vacinal de acordo com a situação encontrada, respeitando as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Na rotina dos serviços públicos de vacinação, há duas vacinas disponíveis para proteção contra o sarampo: vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela). De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, trabalhadores da saúde, independentemente da idade, que não tenham sido vacinados com a tríplice viral devem receber
- 1 dose da vacina.
  - 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 15 dias entre elas.
  - 3 doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre elas.
  - 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas

27. A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e emergência, voltada para avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Considerando a escala proposta pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Vermelho - trata-se de atendimento de urgência, indica prioridade 1
- b) Amarelo - trata-se de atendimento o mais rápido possível, indica prioridade 2
- c) Azul - trata-se de consulta de baixa complexidade de atendimento, de acordo com o horário de chegada, indica prioridade 3
- d) Verde - prioridade não urgente, indica prioridade 3

28. O protocolo para cirurgia segura tem por finalidade determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Considerando os protocolos do Ministério da Saúde e os cuidados de enfermagem nos períodos operatórios, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- a) Recomenda-se a realização da tricotomia, se houver necessidade, no máximo, duas horas antes do procedimento cirúrgico.
- b) A profilaxia antimicrobiana deve ser realizada em até 60 minutos antes da indução anestésica.
- c) Na primeira hora do pós-operatório imediato, os sinais vitais do paciente devem ser verificados a cada 30 minutos.
- d) O funcionamento do monitor multiparamétrico posicionado para o paciente deve ser verificado durante a indução anestésica

29. Desinfecção e esterilização de materiais hospitalares são importantes para o controle de infecções relacionadas a assistência à saúde, garantindo condições para a recuperação dos pacientes, bem como para a segurança dos mesmos e das equipes de profissionais de saúde envolvidas nas atividades hospitalares. O método amplamente utilizado em ambientes médicos e laboratoriais para garantir a esterilização eficaz de instrumentos cirúrgicos e outros dispositivos sensíveis ao calor é chamado de:

- a) óxido de etileno
- b) filtração
- c) vapor saturado sob pressão (autoclave).
- d) radiação ionizante (raios gama, raios X).

30. Os principais agentes etiológicos das cervicites são a *Neisseria gonorrhoeae* e a *Chlamydia trachomatis*. As cervicites são Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), na maioria dos casos são assintomáticas. Sobre as cervicites assinale a alternativa correta:

- a) As principais queixas na presença de sintomas são: corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunia, disúria, polaciúria e dor pélvica crônica.
- b) A prevalência de cervicite estão associados à: mulheres sexualmente ativas com idade superior a 35 anos; novas ou múltiplas parcerias sexuais; parcerias com IST; história prévia ou presença de outra IST; e, uso regular de preservativo
- c) Não possibilidade de transmissão dessas infecções da mãe para a criança, no parto vaginal
- d) O diagnóstico é clínico, o que implica que não há necessidade de confirmação diagnóstica por métodos laboratoriais

31. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, as diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de atenção à saúde devem ser pactuadas pelas (os):

- a) conferências de saúde.
- b) conselhos estaduais de saúde.
- c) conselhos municipais de saúde.
- d) comissões intergestores.

32. Em um determinado município foram registrados 50 casos novos de tuberculose em 2023, além de 150 casos com tratamento em curso. Com base nesses dados, conclui-se que nesse município, em 2023:

- a) a prevalência de tuberculose foi de 50 casos.
- b) a incidência de tuberculose foi de 200 casos.
- c) a prevalência de tuberculose foi de 150 casos.
- d) a incidência de tuberculose foi de 50 casos

33. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. São considerados de comunicação obrigatória à autoridade de saúde, com notificação pelo município realizada no prazo de até 24 horas, determinadas doenças e(ou) agravos, entre os quais se incluem:

- a) tuberculose e casos de dengue.
- b) violência sexual e tentativa de suicídio.
- c) acidente de trabalho com exposição a material biológico e sífilis.
- d) toxoplasmose e malária na região amazônica.

34. A insulina é um hipoglicemiante utilizado para pacientes em tratamento de diabetes tipo I e diabetes tipo II não responsivo ao tratamento com dieta e/ou hipoglicemiantes orais para melhor controle glicêmico. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a insulina regular deve ser administrada

- a) 5 minutos antes das refeições.
- b) 10 minutos após as refeições.
- c) 15 minutos antes das refeições.
- d) 30 minutos antes das refeições.

35. As insulinas de ação rápida (regular) e as de ação intermediária (NPH) são distribuídas gratuitamente pelo Ministério da Saúde a toda Rede SUS do país. Além disso, tiras reagentes de glicemia e seringas também estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Sobre as insulinas, sabe-se que:

- a) a insulina de curta ação ou rápida é utilizada para tratamento da hiperglicemia associada à refeição.
- b) a agulha 13x4,5 frequentemente utilizada para administrar insulina é a introduzida completamente, em ângulo de 45 graus.
- c) a via de administração da insulina é intradérmica, podendo ser administrada também por via endovenosa.
- d) a absorção varia conforme o local de aplicação, sendo mais rápida nas nádegas e mais lenta nas coxas e abdômen

36. Uma medicação amplamente utilizada é o diclofenaco de sódio. Você atende um paciente com prescrição de diclofenaco de sódio por via intramuscular. As principais precauções que devem ser observadas ao administrar essa medicação são:

- a) administrar o medicamento rapidamente, a fim de obter o efeito mais rápido;
- b) aquecer o medicamento antes da administração para reduzir o desconforto no local da injeção;
- c) administrar o medicamento lentamente e monitorar os sinais vitais do paciente, a fim de diminuir os riscos de efeitos colaterais durante a administração;
- d) administrar o medicamento apenas em horários específicos do dia, evitando momentos em que o paciente esteja em jejum;

37. A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita da atividade mecânica do coração que resulta na ausência de fluxo sanguíneo circulante. Com relação ao atendimento da PCR em adulto, assinale a opção correta.

- a) Na manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação de compressão-ventilação é de 30 compressões torácicas para 2 ventilações
- b) Deve-se interromper as compressões torácicas durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar para instalar os eletrodos de adulto do desfibrilador externo automático (DEA) no tórax do paciente.
- c) Verificar pulso radial para avaliação da PCR

d) Para as compressões torácicas eficazes, todos os socorristas devem fazer compressões a uma frequência de 100 a 110/min

38. Foram prescritos 1500ml de soro glicosado 5% para ser infundido em 6 horas. O cálculo correto do gotejamento em macrogotas e microgotas, respectivamente, é aproximadamente:

- a) 83 macrogotas/min e 250 microgotas/min
- b) 84 macrogotas/min e 300 microgotas/min
- c) 85 macrogotas/min e 300 microgotas/min
- d) 82 macrogotas/min e 260 microgotas/min

39. A promoção da saúde visa reconhecer as diferenciações sociais e assim ampliar o acesso das populações vulneráveis ao Sistema Único de Saúde (SUS). É um dos princípios doutrinários do SUS que tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) a qual isto faz referência é o princípio da:

- a) Equidade.
- b) Autonomia
- c) Universalidade.
- d) Descentralização.

40. A Escala de Coma de Glasgow (ECG) foi criada em 1974, na Universidade de Glasgow na Escócia, e até hoje representa uma das ferramentas de monitorização neurológica mais utilizadas no mundo. A escala de coma de Glasgow com resposta pupilar (ECG-P) é um método que tem como objetivo definir o estado neurológico de pacientes com uma lesão cerebral aguda, analisando seu nível de consciência. Referente à ECG-P, analise as seguintes afirmações:

- I. A pontuação da ECG-P varia de 1 a 15.
  - II. A escala considera três fatores a serem avaliados: abertura ocular, resposta verbal e reação pupilar.
  - III. O escore mínimo da pontuação da escala é 3
  - IV. Se o paciente apresenta reatividade pupilar nos dois olhos, soma-se dois pontos à ECG-P
- Assinale a alternativa correta
- a) Apenas I e II
  - b) Apenas II e IV
  - c) Apenas I e III
  - d) Apenas III e IV